ANAFILAXIÁS SOKK

Az allergia legsúlyosabb formája az anifilaxiás sokk, melyet legtöbb esetben ételallergia, gyógyszerek vagy rovarméreg vált ki, de az is előfordul, hogy a tünetek okát nem sikerül feltárni. Számos jel utalhat rá: az állapotot elszenvedő személy nehezen veszi a levegőt, fullad, verejtékezik, sápad, kiütések, duzzanat és ödéma jelentkezik az arcán. Az ödéma akár a légutakban is jelentkezhet, ami nehezíti és leállíthatja a légzést. Az enyhe szédülés, sápadtság a vérnyomás drasztikus csökkenése okán ájulás léphet fel, végső esetben a teljes keringés is összeomolhat. A kezdetben enyhébbnek tűnő tünetek gyorsan rosszabbodhatnak, és életveszélyes helyzetbe kerülhet a beteg, ha nem ismerjük fel az állapotot.

Legfontosabb tudnivaló, hogy kérjünk mielőbb orvosi segítséget, tárcsázzuk a 112 központi segélyhívót. A segítség megérkezéséig maradjunk a beteggel, és amennyiben a helyzet engedi kérdezzük meg, hogy van-e allergiája ételre vagy gyógyszerre. A gyakorlatban, ha allergiára diagnosztizált személlyel vagyunk, akkor nagy valószínűséggel tart magánál, akár kabátban vagy táskában adrenalininjekciót előre töltött tollban. A gyógyszer közvetlenül a szív és keringési rendszerre, valamint a légzési rendszerre fejti ki a hatását, kivédi az anafilaxia esetlegesen halálos kimenetelű hatásait, mivel gyorsan összehúzza az ereket, a tüdő izmainak ellazításával javítja a légzést, csökkenti a duzzadást és serkenti a szívverést. Az életmentő eszköz csomagolása érthető utasításokat tartalmaz a használatához, melyet pontosan be kell tartani. Az eszköz használata nem pótolja az orvosi ellátást, ezt csak sürgősségi kezelésére tervezték.

Forrás:
https://medicover.hu/hirlevel-cikkek/anafilaxias-sokk-allergia/
https://www.allergiakozpont.hu/hirek/on-tudja-mit-tegyen-anafilaxias-sokk-eseten
https://benu.hu/cikk/az-anafilaxis-sokk-es-tunetei
https://www.webbeteg.hu/cikkek/allergia/15197/anafilaxia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anafilaxia

Összeállította: Filin Noémi

AGORA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT DEBRECEN